Kantonsspital St.Gallen

Umgang mit PEG Sonden / Kathetern und anderen Anlagen

Susi Bolt dipl. Wundexpertin SAFW
Leitung Wundmangement Kantonsspital St.Gallen
Schulungen und Referate in Wundversorgung
susanne.bolt-kobler@kssg.ch

Kantonsspital St.Gallen

Freund oder Feind?

- Erregerwandel nimmt zu
- Multiresistenz nimmt zu
- Keime auf der Haut nehmen zu
- Staphylokokken 30% bei Erwachsenen
- Reisetätigkeit



Kantonsspital St.Gallen



Kantonsspital St.Gallen

Unsere Aufgabe in der Wundversorgung

- Verhinderung einer Keimverschleppung
- Schutz vor lokalem Infekt
- Schutz vor systemischer Ausbreitung
- Behandlung lokaler Infektionen
- Sanierung von Keimträgern.
- Verhinderung von Keimübertragung auf andere Personen

Kantonsspital St.Gallen

Hygiene

- Händedesinkektion
- Handschuhe tragen
- Material sauber aufbewahren
- Pinzetten / Scheren nicht mehrmals brauchen

Kantonsspital St.Gallen

PEG / Freka Sonde

- VW : jeden 2.- 3.Tag
- Essen: Vor und nachher spülen
- Mobilisation: vorsichtig bewegen
- Pflege: Ansatz mit Zahnbürste reinigen
- Verweildauer: kann lange Zeit / Monate belassen werden

Kantonsspital St.Gallen

Probleme bei PEG Sonden

- Entstehung von wildem Fleisch
- Überschuss an Exsudat / Magensaft / Feuchtigkeit
- Reibung mit Sondenmaterial
- Wärme / Bakterien
- Button zu gross / zu lange drin
- AZ reduziert/ Fieber usw.

Kantonsspital St.Gallen



Kantonsspital St.Gallen

Kantonsspital St.Gallen

Kantonsspital St.Gallen

Kantonsspital St.Gallen

Behandlung

Kantonsspital St.Gallen

- Abtrocknung der Wundverhältnisse
- 1.Nass-Trockenphase mit Betadine/ Nacl 0,9 % 10 Tg
- Gazekompresse Mesoft
- 2. ab 11. Tag Nass Trockenphase mit Octenisept
- Schaumstoff / Silikon (Exsudat / Geruch)
- Brücke zwischen Haut + Sonde
- VW 1- 2 x täglich
- Später Comprigel Auflage

Kantonsspital St.Gallen

Ballonsonden = Button

- Wird nach epithelisierung des Kanals gelegt
- können bis 6 Monate liegen bleiben
- 2-4x pro Monat Ballon überprüfen
- Vorteil: kein Katheter, diskret, wird vor allem bei Kindern häufig verwendet
- Wichtig: Grösse muss stimmen, überprüfen

Kantonsspital St.Gallen

JET – PEG Sonden= PEG mit jejunaler Verlängerung

- Kein vor und nachspülen nötig/ nur 1x täglich
- Verstopfen schnell / keine Medikamente darüber verabreichen
- Mobilisation: darf nur geschoben , aber nicht gedreht werden

Kantonsspital St.Gallen

Fein-Nadel- Katheter- Jejunostomie

- Chirurgische Einlage bei Laparotomie
- Kein inneres Widerlager – äussere Halteplatte wird angenäht
- Sonde darf nicht mobilisiert werden
- Markierung muss regelmässig kontrolliert werden

Kantonsspital St.Gallen

Tracheostomien

- Probleme gleich wie bei PEG Sonden
- Exsudat= Schleim
- Fixation sehr empfindlich am Hals
- Läsionen sehr schmerzhaft
- Granulome : Auslöser Infekt, allergisch oder chronisch / sind entzündlich , knotenartig

Kantonsspital St.Gallen

Kantonsspital St.Gallen

Behandlung

- Nass Trockenphase mit Octenisept
- Mepilex (AG) oder Mepilex Lite

- Kendall PUR Schaumverband: PHMB beschichtet, wirksam gegen Gram pos. + Gram neg. Bakterien, antimikrobiell, hohe Absorption

Kantonsspital St.Gallen

Materialien

- Biatain Silikon adhesiv
- Mepilex / Mepilex Lite
- Fixation : Hypafix Gentle Touch (Silikon) 3M Silikonpflaster, X-Trata Folie
- Acticoat Site: silberbeschichtet
- Im Notfall: Eosinlösung 2%

Kantonsspital St.Gallen

„ Kompetenz allein genügt nicht,
Menschen brauchen die Zuwendung des Herzens.

Kantonsspital St.Gallen

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit!